

W diagnozowaniu zaburzeń erekcji wykorzystywana jest ankieta IIEF-5 (International Index of Erectile Function) pozwalająca ocenić stopień zaawansowania zaburzeń:

INFORMACJA DLA PACJENTA

Możliwość współżycia jest jednym z ważniejszych elementów ogólnego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaburzenia wzwodu prącia (zaburzenia erekcji)

są częstymi dolegliwościami dotyczącymi sfery seksualnej mężczyzn. Kwestionariusz IIEF-5 został zaprojektowany tak, aby był pomocny Panu i Pana lekarzowi do oceny Pana erekcji, rozpoznania jej ewentualnych zaburzeń i wskazania odpowiednich metod ich leczenia.

Każde pytanie kwestionariusza jest opatrzone kilkoma odpowiedziami. Spośród odpowiedzi proszę wybrać jedną – tę, która najlepiej określa Pańskie odczucia.

W PRZECIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY:

Jak ocenia Pan swoją pewność, że może Pan utrzymać erekcję?	Bardzo nisko		Nisko	Umiarkowanie	Wysoko	Bardzo wysoko
	1		2	3	4	5
Jeśli erekcja wystąpiła w wyniku stymulacji seksualnej, jak często była nasilona na tyle, że umożliwiła odbycie stosunku płciowego?	Nie było aktywności seksualnej	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
	0	1	2	3	4	5
Jak często podczas stosunku płciowego był Pan w stanie utrzymać erekcję?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
	0	1	2	3	4	5
Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Niezwycie trudno	Bardzo trudno	Trudno	Nieznacznie trudno	Nie miałem trudności
	0	1	2	3	4	5
Jeśli podejmował pan stosunek płciowy, jak często dostarczał on Panu satysfakcji?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej, niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej, niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
	0	1	2	3	4	5

WYNIK (suma punktów):

**Jeżeli uzyskałeś 21 punktów lub mniej skontaktuj się z lekarzem.
Twoje objawy mogą świadczyć o zaburzeniach erekcji!**